

NEOCATE SYNEO, NEOCATE LCP, NEOCATE SPOON OG NEOCATE JUNIOR

Aminosyrebaseret ernæring til børn med diagnosticeret komælksallergi, multipel fødevareallergi eller andre indikationer, hvor en elementardiæt er anbefalet.* Hypoallergen.

Neocate er ernæringsprodukter, hvis proteinindhold består af 100 % frie aminosyrer.

Neocate SYNEO er ernæringsmæssig komplet spædbarnsernæring beregnet til spædbørn på 0-12 måneder. **Neocate SYNEO** kan anvendes til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitisyndrom (FPIES). Produktet indeholder *Bifidobacterium breve* og er ikke egnet til for tidligt fødte børn eller spædbørn, der er immunsupprimerede.

Neocate LCP er ernæringsmæssig komplet spædbarnsernæring beregnet til spædbørn på 0-12 måneder. **Neocate LCP** kan anvendes til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitisyndrom (FPIES).

Neocate Spoon er en hypoallergen grød beregnet som supplerende ernæring til børn fra 6 måneder. **Neocate Spoon** anvendes ved overgang til skemad til ernæringsmæssig håndtering af komælksallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales.

Neocate Junior er en mælkefri erstatning, som kan anvendes som supplement til den øvrige kost til børn mellem 1-10 år. **Neocate Junior** kan anvendes som erstatning for mælk og drikkes fra glas eller alternativt som sondeernæring. Den kan også anvendes som erstatning ved madlavning og bagning. Bemærk, at næringsværdien kan forringes ved opvarmning.

*Indikationen på Neocate Junior varierer fra de andre aminosyrebaserede ernæringsprodukter. Neocate Junior er til børn med Eosinofil øsofagitis (EOE), hvor en elementardiæt er anbefalet.

Neocate SYNEO, Neocate LCP, Neocate Spoon og Neocate Junior er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.



Neocate SYNEO

Anbefalet dosering

Brug den mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af lægen eller diætisten. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og kliniske tilstand.

Den anbefalede koncentration

En måleske giver ca. 4,8 g pulver. Tilsæt 1 støgen måleske pulver for hver 30 ml vand, for at opnå den anbefalede koncentration (14,4 % vægt/volumen). Osmolaliteten ved den anbefalede koncentration er 360 mOsmol/kg vand (dvs. 14,4 g pulver fortyndet med vand til en færdig volumen på 100 ml).

Tilberedning

Brugsanvisning for sutteflaske: DIT BARN HELBRED AFHÆNGER AF AT DU NØJE FØLGER ANVISNINGERNE FOR TILBEREDNING OG ANVENDELSE. FORKERT TILBEREDNING KAN GØRE DIT BARN SYGT.

1. Vask hænderne grundigt og rengør tilberedningsområdet. Sterilisér flasker og sutter.
2. Kog koldt, frisk vand i 5 minutter eller indtil elkedlen slukker. Hæld den nødvendige mængde vand i den steriliserede flaske, dæk flasken med hættens og afkøl i mindst 30 minutter til vandet føles lunkent på håndledet.
3. Fyld den vedlagte måleske med pulver og jævn ud med en ren og tør kniv. Tryk ikke pulveret ned i måleskeen. Brug kun den måleske, som findes i dåsen.
4. Tilsæt det foreskrevne antal måleskeer af pulver til vandet. Sæt låget på flasken og ryst flasken, indtil pulveret er opløst. Husk at kontrollere at blandingen har den korrekte temperatur ved at placere et par dråber på indersiden af håndledet.
5. Rester af den tilberedte blanding i flasken, der ikke bruges inden for en time, skal kasseres. Blandingen må ikke opvarmes på ny med henblik på indtagelse.

Vigtigt

Dette er et ikke-sterilt, pulverbaseret ernæringsprodukt til spædbørn. Produktet skal tilberedes umiddelbart før brug. Blandingen skal ikke koges, tilberedes eller opvarmes i mikrobølgeovn. Forkert opvarmning og forberedelse kan påvirke produktets sammensætning og *Bifidobacterium breve*.

Vigtig information om tandhygiejne

God mundhygiejne er vigtig for både spædbørn og børn, da hyppig eller længerevarende brug af drikke- eller sutteflaske øger risikoen for tandskader. Børst tænderne efter det sidste måltid om aftenen.

Neocate SYNEO			Tilberedning pr. måltid	
Ca. alder	Ca. kropsvægt kg	Antal strøgne måleskeer	Afkølet, kogt vand (ml)	Måltider pr. døgn
Nyfødt	3,5	3	90	6-7
2 uger	4,0	4	120	6
2 måneder	5,5	5	150	5-6
3 måneder	6	6	180	5
5 måneder	7,5	7	210	4-5
7 måneder	8,5	7	210	4
10 måneder	9	8	240	4

Kun vejledende: Spædbarnet kan kræve mere eller mindre end de mængder der er givet i tabellen. Hvis der tilføjes andre fødevarer, bør dette kun ske under lægelig overvågning eller under vejledning fra diætist. Det kan være nødvendigt at reducere de angivne mængder som givet af dette produkt tilsvarende.

Vigtigt

Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Modernælk er den bedste ernæring til spædbørn. Skal anvendes under lægelig overvågning, under fuld hensyntagen til at alle ernæringsmæssige muligheder er blevet overvejet, herunder amning. Egnethed som eneste kilde til ernæring for spædbørn under 1 år. **Neocate Syneo** indeholder *Bifidobacterium breve* og er ikke egnet til for tidligt fødte børn eller spædbørn, der er immunsupprimerede. Anbefales ikke til spædbørn med centralt venekateter, postpylorisk ernæringssonde eller korttarmssyndrom uden at alle risici og fordele er blevet vurderet af en sundhedsfaglig person og uden at patienten overvåges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Sæt altid låget på beholderen efter brug. Efter åbning, anvendes indholdet inden for 2 uger. Pakket i beskyttende atmosfære.

Ingredienser

Neocate SYNEO

Tørret glucosesirup, raffinerede vegetabiliske olier (mellemkædede triglycerider (kokosolie og/eller palmeolie), oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, solsikkeolie), fibre (oligofruktose (sc-FOS), inulin (lc-FOS), 2'-fukosyllaktose), L-arginin-L-aspartat, L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-prolin, L-valin, emulgator (E472c), L-isoleucin, glycin, L-threonin, dikaliumhydrogenfosfat, L-phenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, calciumfosfat dibasisk, trikaliumcitrat, natriumchlorid, calciumkarbonat, L-cystin, cholinbitartrat, calciumglycerofosfat, L-tryptophan, calciumcitrat, magnesiumchlorid, L-methionin, olie fra *Cryptocodium cohnii*, tricalciumfosfat tribasisk, olie fra *Mortierella alpina*, magnesium-L-aspartat, inositol, L-ascorbinsyre, antioxidanter (solsikkelecithin, ascorbylpalmitat), taurin, jernsulfat, *Bifidobacterium breve* M-16V, zinksulfat, L-karnitin, DL- α -tocopherylacetat, uridin 5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin 5'-monofosfat, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, inosin 5'-monofosfatnatriumsalt, adenosin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfatnatriumsalt, kobbersulfat, thiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kaliumjodid, mangansulfat, pteroylmonoglutaminsyre, phytomenadion, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Neocate LCP

Dosering

Brug den mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af læge eller diætist. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand. En strøgen måleske giver ca. 4,5 g. For hver 30 ml vand tilsættes 1 måleske for at opnå den anbefalede koncentration (13,5% vægt/volumen). Osmolaliteten ved den anbefalede koncentration er 340 mOsmol/kg H₂O (dvs. 13,5 g pulver fortyndet med vand til en færdig volumen på 100 ml).

Tilberedning

Brugsanvisning for sutteflaske: BARNETS HELBRED AFHÆNGER AF AT DU NØJE FØLGER ANVISNINGERNE FOR TILBEREDNING OG ANVENDELSE. FORKERT TILBEREDNING KAN GØRE BARNET SYGT.

1. Vask hænderne grundigt og rengør tilberedningsområdet. Steriliser flaske og sutte.
2. Kog friskt vand i 5 minutter, eller indtil elkedlen slukker. Lad vandet afkøle mindst 30 minutter til det føles lunkent på indersiden af håndledet. Hæld den ønskede mængde vand i en steriliseret sutteflaske.
3. Fyld den vedlagte måleske med pulver og jævn ud med en ren, tør kniv. Tryk ikke pulveret ned i måleskeen. Brug kun den måleske som findes i dåsen.
4. Tilsæt det foreskrevne antal måleskeer af pulver til vandet. Sæt låget på flasken og ryst flasken, indtil pulveret er opløst. Husk at kontrollere at blandingen har den korrekte temperatur ved at placere et par dråber på indersiden af håndledet.
5. Rester af tilberedt blanding i flasken, der ikke bruges inden for en time, skal kasseres. Blanding må ikke opvarmes på ny med henblik på indtagelse.

Bemærk:

Dette er et ikke-sterilt, pulverbaseret ernæringsprodukt til spædbørn. Produktet skal tilberedes umiddelbart før brug. Blanding skal ikke koges, tilberedes eller opvarmes i mikrobølgeovn.

Vigtigt:

Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Modernælk er den bedste ernæring til spædbørn. Neocate LCP er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning, under fuld hensyntagen til at alle ernæringsmæssige muligheder er blevet overvejet, herunder amning. Egnethed til at være eneste ernæringskilde for spædbørn under 1 år.

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt. Sæt altid låget på beholderen efter brug. Skal anvendes indenfor 1 måned efter åbning. Pakket i beskyttende atmosfære.

Neocate LCP

Vejledende mængde

Ca. alder	Ca. kropsvægt	Antal strøgne måleskeer	Afkølet, kogt vand	Antal måltider pr. døgn
Nyfødt	3,5 kg	3	90 ml	6-7
2 uger	4 kg	4	120 ml	6
2 måneder	5,5 kg	5	150 ml	5-6
3 måneder	6 kg	6	180 ml	5
5 måneder	7,5 kg	7	210 ml	4-5
7 måneder	8,5 kg	7	210 ml	4
10 måneder	9 kg	8	240 ml	4

Kun vejledende: Spædbarnet kan kræve mere eller mindre end de mængder der er givet her i tabellen. Hvis der tilføjes andre fødevarer, bør dette kun ske under lægelig overvågning eller under vejledning fra diætist. Det kan være nødvendigt at reducere de angivne mængder som givet af dette produkt tilsvarende.

Ingredienser

Neocate LCP

Tørret glukosesirup, raffineret vegetabilsk olie (oliesyrerig solsikkeolie, kokosolie, rapsolie, solsikkeolie), L-arginin-L-aspartat, L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-prolin, emulgator (E472c), L-valin, glycin, L-isoleucin, dikaliumhydrogenphosphat, L-threonin, L-phenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, calciumfosfat dibasisk, trikaliumcitrat, natriumchlorid, calciumkarbonat, cholinbitartrat, L-cystin, calciumglycerophosphat, L-tryptophan, calciumcitrat, magnesiumchlorid, olie fra *Cryptocodium cohnii*, L-methionin, calciumfosfat tribasisk, olie fra *Mortierella alpina*, magnesium-L-aspartat, inositol, L-ascorbinsyre, antioxidanter (solsikkelecithin, ascorbylpalmitat), taurin, jernsulfat, zinksulfat, L-carnitin, DL- α -tocopherylacetat, uridin 5-monofosfatnatriumsalt, cytidin 5-monofosfat, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, inosin 5-monofosfatnatriumsalt, adenosin 5-monofosfat, guanosin 5-monofosfatnatriumsalt, kobbersulfat, thiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kaliumjodid, mangansulfat, pteroylmonglutaminsyre, phytomenadion, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Neocate LCP

Vand	Pulver	Færdig mængde, ca.
30 ml	1 måleskefuld	35 ml
90 ml	3 måleskefulde	100 ml
180 ml	6 måleskefulde	200 ml



Neocate Spoon

Dosering

Brug den mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af lægen eller diætisten. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og kliniske tilstand. En strøgen måleske giver 4,6 g pulver. Brug en gramvægt for nøjagtighed. Tilsæt 8 måleskeer (37 g) med pulver til 60 ml vand.

Spædbørn bør få dette produkt som supplement til modermælk eller hypoallergen modermælkserstatning. Til spædbørn der opstarter med fast føde, kan konsistensen af produktet ændres ved at tilsætte mere eller mindre vand efter behov. Det anbefales, at der anvendes afkølet, kogt vand ved tilberedning af produktet til spædbørn.

Tilberedning

BARNETS HELBRED AFHÆNGER AF, AT DU NØJE FØLGER ANVISNINGERNE FOR TILBEREDNING OG ANVENDELSE. FORKERT TILBEREDNING KAN GØRE BARNET SYGT.

1. Vask hænderne og rengør alle redskaber.
2. Kog frisk vand i 5 minutter, eller indtil elkedlen slukker.
3. Afkøl vandet i mindst 30 minutter til det føles lunkent på indersiden af håndleddet.
4. Brug kun den måleske som findes i dåsen. Fyld den vedlagte måleske med pulver og jævn ud med en ren, tør kniv. Tryk ikke pulveret ned i måleskeen.
5. Tilsæt det anbefalede antal måleskeer pulver i en ren skål.
6. Tilsæt gradvist den nødvendige mængde vand under omrøring med en ren ske. Bland indtil konsistensen er blevet tyk. Dette kan tage flere minutter. For at ændre konsistensen tilsæt mere eller mindre vand efter behov.

Bemærk

Tilberedes lige før servering. Smid rester ud som er tilovers 1 time efter brug. Produktet kan tilføjes tilberedt mad. Tilsæt ikke til meget varm mad. Opvarm ikke det færdig tilberedt produkt.

Vigtigt

Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Ikke egnet til flaske- eller sondeernæring. Skal anvendes under lægelig overvågning. Egnet til børn over 6 måneders alder. Ikke egnet til at være eneste ernæringskilde.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Sæt altid låget på beholderen efter brug. Opbevares ikke i køleskab. Skal anvendes inden for en måned efter åbning. Pakket i beskyttende atmosfære.

Ingredienser

Neocate Spoon

Tørret glukosesirup, prægelatineret risstivelse, raffinerede vegetabilske olier (ikke-hydrogeneret kokosolie, oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, solsikkeolie), aminosyrer (L-arginin-L-aspartat, L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-prolin, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-phenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, L-cystin, L-tryptofan, L-metionin), sukker, tricalciumfosfat tribasisk, emulgator (E472c), cholinbitartrat, magnesium-L-aspartat, magnesiumacetat, inositol, L-askorbinsyre, jernsulfat, taurin, zinksulfat, L-karnitin, DL- α -tocopherylacetat, calcium-D-pantotenat, nikotinamid, mangansulfat, kobbersulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, kaliumjodid, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyre, natriumselenit, natriummolybdat, phytomenadion, D-biotin, cholecalciferol, cyanokobalamin.

Neocate Spoon

Vand	Pulver	Færdig mængde, ca.
60 ml	8 måleskefulde	97 g



Neocate Junior

Dosering

Brug den mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af lægen eller diætisten. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og kliniske tilstand. 1 strøgen måleske giver 7,3 g pulver. Den anbefalede koncentration er 21,1 % vægt/volumen (1 kcal/ml). Tilsæt 1 strøgen måleske til 30 ml vand for at opnå denne koncentration.

Tilberedning

1. Vask hænderne og rengør alle redskaber.
2. Mål den anbefalede mængde vand i en beholder.
3. Tilsæt den anbefalede mængde pulver til vandet. Brug kun den måleske som findes i dåsen.
4. Dæk til og ryst beholderen indtil pulveret er opløst. Opblandet drik opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer. Ryst eller omrør produktet umiddelbart før servering.

Serveres bedst afølet, når den gives som ernæringsdrik. Hænge-tiden for sondeernæring bør ikke overskride 4 timer.

Bemærk

Kog ikke den færdige blanding. Brug ikke mikrobølgeovn til at tilberede eller varme blandingen.

Vigtigt

Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Skal anvendes under lægelig overvågning. Ikke egnet til spædbørn under 1 år. Egnet som et supplement til barnets kost.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Sæt altid låget på beholderen efter brug. Skal anvendes indenfor 1 måned efter åbning. Pakket i beskyttende atmosfære.

Neocate Junior pr. 100 ml

	0,69 kcal/ml 14,5% vægt/ volumen	1 kcal/ml 21,1% vægt/ volumen	1,26 kcal/ml 26,5% vægt/ volumen
Energi, kJ/kcal	289/69	420/100	528/126
Protein, g	1,9	2,8	3,5
Osmolalitet, mOsmol/kg H ₂ O	380	600	800
Antal måleskefulde pr. 90 ml vand ved forskellige fortyndinger.	2 måleskefulde + 90 ml vand	3 måleskefulde + 90 ml vand	4 måleskefulde + 90 ml vand



Ingredienser

Neocate Junior

Tørret glucosesirup, raffinerede vegetabiliske olier (mellemkædede triglycerider (palmekerneolie og / eller kokosolie), oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, solsikkeolie), L-serin, L-glutamin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lysinacetat, L-threonin, aroma¹, kaliumcitrat, L-tyrosin, aroma², emulgator (citronsyreester af mono- og diglycerider af fedtsyrer), L-valin, L-isoleucin, calciumhydrogenphosphat, magnesiumchlorid, L-prolin, natriumhydrogenphosphat, calciumkarbonat, L-cystin, L-histidin, L-phenylalanin, dikaliumhydrogenphosphat, L-methionin, L-arginin, natriumchlorid, cholinbitartrat, L-tryptophan, calciumcitrat, L-ascorbinsyre, calciumchlorid, smagsforstærker (E330)¹, antioxidant (solsikkelecithin, ascorbylpalmitat), taurin, inositol, jernsulfat, L-carnitin, zinksulfat, DL- α -tocopherylacetat, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, kobbersulfat, riboflavin, mangansulfat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, natriummolybdat, chromchlorid, natriumselenit, phytomenadion, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Rækkefølgen i forhold til ingredienser varierer mellem smagsvarianterne.

1) Gælder jordbærsmag

2) Gælder vanillesmag

VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Neocate SYNEO	204867	6 x 400 g dåse
Neocate LCP	201773	6 x 400 g dåse
Neocate Spoon	194980	1 x 400 g dåse
Neocate Junior Neutral smag	211721	1 x 400 g dåse
Neocate Junior Jordbær smag	212049	1 x 400 g dåse
Neocate Junior Vanille smag	212050	1 x 400 g dåse

Serumniveauer af mikronæringsstoffer, herunder særligt fosfor, bør rutinemæssigt monitoreres når Neocate® anvendes som den primære eller eneste ernæringskilde hos patienter med kompleks, systemisk sygdom som involverer multiple diagnoser og tarmsygdomme, særligt i kombination med sondeernæring og/eller en historik med præmaturitet. Neocate® anvendes i samråd med læge.

Næringsindhold

		Neocate SYNEO		Neocate LCP		Neocate Spoon		Neocate Junior*	
		Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (14,4% fortynding)	Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (13,5 g pulver)	Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (37 g pulver)	Pr. 100 g pulver	Pr. 100 ml (21,1% fortynding)
Energi	kJ	1989	286	2062	278	1981	733	1985	419
	kcal	475	68	493	67	472	175	473	100
Fedt	g	E% 45 23,6	3,4	E% 46,7 25,6	3,5	E% 36 18,8	7,0	E% 41,7 21,9	4,6
heraf									
- mættede fedtsyrer	g	10,5	1,5	10,1	1,4	6,9	2,6	9,7	2,1
- enkeltumættede fedtsyrer	g	9,3	1,3	11,4	1,5	7,5	2,8	7,7	1,6
- flerumættede fedtsyrer	g	3,8	0,55	4,1	0,56	3,5	1,3	4,0	0,84
n6/n3 ratio		7,09	7,09	7,58	7,58	10	10	10:4	10:4
Kulhydrat	g	E% 42 50,3	7,2	E% 42,5 52,7	7,1	E% 57 67,4	24,9	E% 47 55,9	11,8
heraf									
- sukkerarter	g	4,7	0,68	4,6	0,62	12,3	4,6	4,9	1,0
-- laktose	g	-	-	-	-	-	-	-	-
-- glukose	g	0,99	0,14	1,0	0,14	0,81	0,30	1,1	0,23
-- maltose	g	3,4	0,48	3,6	0,49	2,8	1,0	3,9	0,81
-- maltotriose	g	-	-	-	-	4,0	1,5	5,5/5,6*	1,2
- polysakkarider	g	44,4	6,4	46,8	6,3	51,1	18,9	45,4	9,6
Kostfibre	g	E% 2 4,6	0,66	E% 0 -	-	E% 0 -	-	E% 0 -	-
Proteinækvivalenter	g	E% 11 3,2	1,9	E% 10,8 13,3	1,8	E% 7 8,2	3,0	E% 11,3 13,4	2,8
Salt	g	0,52	0,08	0,53	0,07	0,11	0,04	0,72	0,15
Mineraler og sporstoffer									
Natrium	mg (mmol)	206 (8,97)	29,7 (1,29)	212 (9,2)	28,6 (1,25)	42 (1,8)	15,5 (0,67)	287 (12,5)	60,6 (2,64)
Kalium	mg (mmol)	515 (13,2)	74,2 (1,90)	536 (13,7)	72,4 (1,85)	<20 (<1,0)	<10 (<0,5)	546 (14)	115 (2,9)
Chlorid	mg (mmol)	375 (10,6)	53,9 (1,52)	386 (10,9)	52,1 (1,47)	48 (1,4)	17,8 (0,52)	441 (12,4)	93,0 (2,62)
Calcium	mg (mmol)	559 (13,9)	80,4 (2,01)	580 (14,5)	78,3 (1,95)	716 (17,9)	265 (6,6)	428 (10,7)	90,3 (2,3)
Fosfor	mg (mmol)	354 (11,4)	50,9 (1,65)	370 (11,9)	49,9 (1,61)	377 (12,2)	139 (4,5)	309 (10)	65,2 (2,1)
Magnesium	mg (mmol)	50,3 (2,07)	7,24 (0,30)	52 (2,14)	7,02 (0,29)	23,1 (0,96)	8,5 (0,35)	66,5 (2,7)	14 (0,57)
Jern	mg	7,08	1,02	7,39	1,0	6,5	2,4	5,7	1,2
Zink	mg	5,19	0,75	5,42	0,73	4,5	1,7	5,2	1,1
Kobber	mg	0,40	0,058	0,42	0,057	0,34	0,13	0,48	0,1
Mangan	mg	0,047	0,007	0,049	0,007	0,34	0,13	0,30	0,06
Jod	µg	99,1	14,3	103	14	41,4	15,3	71,3	15
Molybdæn	µg	11,7	1,69	11,3	1,53	9,7	3,6	21,4	4,5
Selen	µg	17,9	2,58	18,7	2,53	12,4	4,6	15,2	3,2
Chrom	µg	10,4	1,50	10,8	1,46	11,0	4,1	10,5	2,22
Vitaminer									
Vitamin A	µg	416	59,8	431	58,2	195	72,2	214	45,2
Vitamin D	µg	11,3	1,63	11,8	1,59	4,3	1,6	6,2	1,3
Vitamin E	(mg α-TE) mg	(11,6) 10,3	(1,67) 1,49	(9,85) 11	(1,33) 1,49	(2,3)	(0,84)	(8,6)	(1,81)
Vitamin K	µg	43	6,20	44,7	6,0	18,5	6,8	25,6	5,40
Thiamin	mg	0,57	0,08	0,59	0,08	0,25	0,09	0,48	0,1
Riboflavin	mg	0,57	0,08	0,59	0,08	0,25	0,09	0,95	0,2
Niacin	(mg NE) mg	(9,25) 3,94	(1,33) 0,57	(9,41) 4,09	(1,27) 0,55	(3,9) 1,1	(1,5) 0,41	(9,0) 5,3	(1,9) 1,1
Pantothensyre	mg	2,94	0,42	3,05	0,41	1,4	0,52	1,9	0,4
Vitamin B ₆	mg	0,46	0,07	0,48	0,06	0,25	0,09	0,48	0,1
Folinsyre	µg	66,0	9,51	68,5	9,24	27,5	10,2	71,3	15,4
Vitamin B ₁₂	µg	1,33	0,19	1,38	0,19	0,60	0,22	1,2	0,25
Biotin	µg	18,5	2,67	19,2	2,59	9,1	3,4	14,3	3,0
Vitamin C	mg	50,4	7,26	52,7	7,11	23	8,5	47,5	10
Andet									
Cholin	mg	132	19,0	137	18,5	45	16,7	95	20
Inositol	mg	106	15,3	110	14,9	49	18,1	26,1	5,5
L-karnitin	mg	10,4	1,5	9,85	1,33	5,9	2,2	15,8	3,3
Taurin	mg	30,8	4,44	32	4,32	15,9	5,9	31,6	6,68
Nukleotider	mg	16,4	2,37	17,2	2,33	-	-	-	-
Osmolaritet	mOsmol/l	-	-	-	310	-	-	-	510/520**
Osmolalitet	mOsmol/kgH ₂ O	-	360	-	340	-	-	-	590

* De 3 forskellige smagsvarianter kan variere i næringsindhold med 0,1 %

** Gælder for Neutral