

NEOCATE SYNEO

Aminosyrebaseret ernæring til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevarerallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales. Hypoallergen.

Neocate SYNEO er et ernæringsmæssigt komplet ernæringsprodukt til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevarerallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og protein-induceret enterocolitissyndrom (FPIES). Hypoallergen, aminosyrebaseret, ernæringsmæssigt fuldgyldigt, ernæringsprodukt til spædbørn. Egnet som eneste kilde til ernæring for spædbørn under 1 år.



Neocate SYNEO er en fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

Anbefalet dosering

Brug den mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af lægen eller diætisten. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og kliniske tilstand.

Den anbefalede koncentration

En måleske giver ca. 4,8 g pulver. Tilsæt 1 støgen måleske pulver for hver 30 ml vand, for at opnå den anbefalede koncentration (14,4 % vægt/volumen). Osmolaliteten ved den anbefalede koncentration er 360 mOsmol/kg vand (dvs. 14,4 g pulver fortyndet med vand til en færdig volumen på 100 ml).

Tilberedning

Brugsanvisning for sutteflaske: DIT BARN S HELBRED AFHÆNGER AF AT DU NØJE FØLGER ANVISNINGERNE FOR TILBEREDNING OG ANVENDELSE. FORKERT TILBEREDNING KAN GØRE DIT BARN SYGT.

1. Vask hænderne grundigt og rengør tilberedningsområdet. Sterilisér flasker og sutter.
2. Kog koldt, frisk vand i 5 minutter eller indtil elkedlen slukker. Hæld den nødvendige mængde vand i den steriliserede flaske, dæk flasken med hættten og afkøl i mindst 30 minutter til vandet føles lunkent på håndledet.
3. Fyld den vedlagte måleske med pulver og jævn ud med en ren og tør kniv. Tryk ikke pulveret ned i måleskeen. Brug kun den måleske, som findes i dåsen.
4. Tilsæt det foreskrevne antal måleskeer af pulver til vandet. Sæt låget på flasken og ryst flasken, indtil pulveret er opløst. Husk at kontrollere at blandingen har den korrekte temperatur ved at placere et par dråber på indersiden af håndledet.
5. Rester af den tilberedte blanding i flasken, der ikke bruges inden for en time, skal kasseres. Blandingens må ikke opvarmes på ny med henblik på indtagelse.

Vigtigt

Dette er et ikke-sterilt, pulverbaseret ernæringsprodukt til spædbørn. Produktet skal tilberedes umiddelbart før brug. Blandingens skal ikke koges, tilberedes eller opvarmes i mikrobølgeovn. Forkert opvarmning og forberedelse kan påvirke produktets sammensætning og *Bifidobacterium breve*.

Vigtig information om tandhygiejne

God mundhygiejne er vigtig for både spædbørn og børn, da hyppig eller længerevarende brug af drikke- eller sutteflaske øger risikoen for tandskader. Børst tænderne efter det sidste måltid om aftenen.

Neocate SYNEO		Tilberedning pr. måltid		
Ca. alder	Ca. kropsvægt kg	Antal strøgne måleskeer	Afkølet, kogt vand (ml)	Måltider pr. døgn
Nyfødt	3,5	3	90	6-7
2 uger	4,0	4	120	6
2 måneder	5,5	5	150	5-6
3 måneder	6	6	180	5
5 måneder	7,5	7	210	4-5
7 måneder	8,5	7	210	4
10 måneder	9	8	240	4

Kun vejledende: Spædbarnet kan kræve mere eller mindre end de mængder der er givet i tabellen. Hvis der tilføjes andre fødevarer, bør dette kun ske under lægelig overvågning eller under vejledning fra diætist. Det kan være nødvendigt at reducere de angivne mængder som givet af dette produkt tilsvarende.

Vigtigt

Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Modermælk er den bedste ernæring til spædbørn. Skal anvendes under lægelig overvågning, under fuld hensyntagen til at alle ernæringsmæssige muligheder er blevet overvejet, herunder amning. Egnet som eneste kilde til ernæring for spædbørn under 1 år. **Neocate Syneo** indeholder *Bifidobacterium breve* og er ikke egnet til for tidligt fødte børn eller spædbørn, der er immunsupprimerede. Anbefales ikke til spædbørn med centralt venekateter, postpylorisk ernæringssonde eller korttarmssyndrom uden at alle risici og fordele er blevet vurderet af en sundhedsfaglig person og uden at patienten overvåges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Sæt altid låget på beholderen efter brug. Efter åbning, anvendes indholdet inden for 2 uger. Pakket i beskyttende atmosfære.

Ingredienser

Tørret glucosesirup, raffinerede vegetabiliske olier (mellemkædede triglycerider (kokosolie og/eller palmeolie), oliesyrerig solsikkeolie, rapsolie, solsikkeolie), fibre (oligofruktose (sc-FOS), inulin (lc-FOS), 2'-fukosyllaktose), L-arginin-L-aspartat, L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-prolin, L-valin, emulgator (E472c), L-isoleucin, glycin, L-threonin, dikaliumhydrogenfosfat, L-phenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, calciumfosfat dibasisk, trikaliumcitrat, natriumchlorid, calciumkarbonat, L-cystin, cholinbitartrat, calciumglycerofosfat, L-tryptophan, calciumcitrat, magnesiumchlorid, L-methionin, olie fra *Cryptocodium cohnii*, tricalciumfosfat tribasisk, olie fra *Mortierella alpina*, magnesium-L-aspartat, inositol, L-ascorbinsyre, antioxidanter (solsikkelecithin, ascorbylpalmitat), taurin, jernsulfat, *Bifidobacterium breve* M-16V, zinksulfat, L-karnitin, DL- α -tocopherylacetat, uridin 5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin 5'-monofosfat, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, inosin 5'-monofosfatnatriumsalt, adenosin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfatnatriumsalt, kobbersulfat, thiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, kaliumjodid, mangansulfat, pteroylmonoglutaminsyre, phytomenadion, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Gennemsnitlig næringsindhold

		Pr. 100 g pulver		Pr 100 ml*	
Energi	kJ	1985		286	
	kcal	474		68	
Fedt E% 45	g	23,6		3,4	
heraf					
- mættede fedtsyrer	g	10,5		1,5	
- enkeltumættede fedtsyrer	g	9,3		1,3	
- flerumættede fedtsyrer	g	3,8		0,55	
-- linolsyre (LA)	g	3,09		0,445	
-- α -linolensyre (ALA)	g	0,31		0,045	
-- arachidonsyre (AA)	g	0,12		0,0171	
-- docosaheksaensyre (DHA)	g	0,12		0,0171	
Kulhydrat E% 42	g	50,2		7,2	
heraf					
- sukkerarter	g	4,7		0,67	
Kostfibre E% 2	g	4,6		0,66	
- scFOS/lcFOS	g	4,45		0,64	
- 2'fukosyllactose	g	0,14		0,02	
Proteinækvivalent E% 11	g	13,2		1,9	
Salt	g	0,52		0,08	
Mineraler og sporstoffer					
Natrium	mg	209		30,0	
Kalium	mg	520		74,8	
Chlorid	mg	378		54,4	
Calcium	mg	550		79,2	
Fosfor	mg	358		51,5	
Magnesium	mg	50,0		7,20	
Jern	mg	7,11		1,02	
Zink	mg	5,19		0,75	
Kobber	mg	0,40		0,058	
Mangan	mg	0,047		0,007	
Flourid	μ g	\leq 42,7		\leq 6,14	
Molybdæn	μ g	10,9		1,57	
Selen	μ g	18,0		2,59	
Chrom	μ g	10,4		1,50	
Jod	μ g	99,6		14,3	
Vitaminer					
Vitamin A	μ g	415		59,7	
Vitamin D	μ g	11,4		1,64	
Vitamin E	(α -TE) mg	(9,48) 10,6		(1,37) 1,52	
Vitamin K	μ g	42,8		6,17	
Thiamin	mg	0,57		0,08	
Riboflavin	mg	0,57		0,08	
Niacin	(mg NE) mg	(9,25) 3,94		(1,33) 0,57	
Pantotensyre	mg	2,94		0,42	
Vitamin B ₆	mg	0,46		0,07	
Folinsyre	μ g	66,0		9,51	
Folat	μ g	110		15,8	
Vitamin B ₁₂	μ g	1,33		0,19	
Biotin	μ g	18,5		2,66	
Vitamin C	mg	50,7		7,31	
Andet					
Cholin	mg	132		19,0	
Inositol	mg	106		15,3	
L-Carnitin	mg	9,49		1,37	
Taurin	mg	30,8		4,44	
Nukleotider	mg	16,6		2,39	
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O			360	

* Ved den anbefalede koncentration (14,4 % vægt/volumen).

Serumniveauer af mikronæringsstoffer, herunder særligt fosfor, bør rutinemæssigt monitoreres når Neocate anvendes som den primære eller eneste ernæringskilde hos patienter med kompleks, systemisk sygdom som involverer multiple diagnoser og tarmsygdomme, særligt i kombination med soeandernærning og/eller en historik med præmaturitet. Neocate anvendes i samråd med læge.

VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Neocate SYNEO	195437	1 x 400 g dåse